



# TAUPIN ROUGE



04/12/2018 - **ROSALIA** - Coléoptères

## COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?

Mesurant 8,5 à 14 mm, le Taupin rouge est bien reconnaissable à la couleur rouge sang de ses élytres et à la pubescence rouge, plus rarement grisâtre ou noire, de la tête et du thorax.

## RÉPARTITION DE L'ESPÈCE EN ISÈRE

Le taupin rouge est présent en Isère dans les zones boisées fraîches de plaine ou de basse altitude jusqu'à 1500 m.





## ÉCOLOGIE LOCALE

*Anostirus purpureus* est une espèce sylvicole (qui vit dans les forêts) dont la larve se développe dans le bois pourri, principalement les saules.

On observe l'adulte sur les ombelles d'Apiacées et de Carduacées, sur les grumes (pièce de bois) ou piles de bois.

V. 2.

102. Umbelliferae



386. *Daucus Carota* L.

Carota Mehrrübe

## PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS

L'adulte se nymphose (transformation d'une larve d'insecte en nymphe) dans le sol et apparaît dès le mois d'avril dans la zone collinéenne, jusqu'en juillet en montagne.

## ACTIONS FAVORABLES À L'ESPÈCE

Laisser sur place les troncs pourris de saule (et autres feuillus) afin de préserver le lieu de ponte de l'espèce.

## LIENS

- **Club Entomologique Dauphinois "Rosalia"** (<http://clubrosalia.free.fr/>) [1]
- **En savoir plus sur cette espèce sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN)** ([https://inpn.mnhn.fr/espece/cd\\_nom/11423](https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11423)) [2]