DENTICOLLE BORÉAL

28/04/2016 - ROSALIA - Coléoptères

COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?

Entièrement noir ou brunâtre, ce coléoptère mesure 10 à 13 mm de long.

RÉPARTITION DE L'ESPÈCE EN ISÈRE

Plus connu en Europe du Nord, il n'est connu en France que du Vercors, dans la station de Saint-Agnan-en-Vercors à 1 300 mètres d'altitude.

ÉCOLOGIE LOCALE

La larve se développe, en Europe du Nord, dans le bois mort des bouleaux. L’espèce est présente dans des zones froides, boréales ou montagneuses.

PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS

Le comportement saisonnier en France de cette espèce reste à découvrir…

ACTIONS FAVORABLES À L’ESPÈCE

Maintenir les bois morts de feuillus dans les zones très froides de montagne.

COMMENTAIRE DE L'AUTEUR

Si vous avez des informations complémentaires, n’hésitez pas à **nous contacter** *(http://www.nature-isere.fr/contact)* [1] pour améliorer cette fiche. Merci.

LIENS

- **Club Entomologique Dauphinois "Rosalia"** *(http://clubrosalia.free.fr/)* [2]