



CLAIRON DES ABEILLES



09/05/2016 - **ROSALIA** - Coléoptères

COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?

De longs poils recouvrent tout le corps du clairon des abeilles. Ses pattes sont noires avec des reflets bleutés. Ses ailes dures, les élytres, sont rayées de noir bleuté et de rouge. Leur extrémité est noire, contrairement au Clairon des ruches (<https://www.nature-isere.fr/node/146>) [1]. Le corps du clairon des abeilles est allongé et mesure 0,9 à 1,6 cm de long.

RÉPARTITION DE L'ESPÈCE EN ISÈRE

Le Clairon des abeilles est commun en plaine et peut vivre jusqu'à 1 500 mètres d'altitude.

ÉCOLOGIE LOCALE

La larve et l'adulte sont carnassiers. La larve du clairon se nourrit de larves et de nymphes d'abeilles sauvages et parfois d'abeilles domestiques si la ruche est négligée. L'adulte se nourrit de pollen, de nectar ou des petits insectes présents sur les fleurs qu'il visite.

PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS

L'adulte est visible au printemps et en été.

ACTIONS FAVORABLES À L'ESPÈCE

Eviter les pesticides qui sont néfastes pour les abeilles et les guêpes, mais également pour les clairons.

COMMENTAIRE DE L'AUTEUR

Si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à **nous contacter** (<http://www.nature-isere.fr/contact>) [2] pour améliorer cette fiche. Merci.

LIENS

- **Club Entomologique Dauphinois "Rosalia"** (<http://clubrosalia.free.fr/>) [3]