



nature isère
espace de découverte et de partage

DIAPÈRE DU BOLET



06/09/2019 - **ROSALIA** - Coléoptères

COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?

La Diapère du bolet est de forme bombée. Ses élytres sont noirs et brillants, Il possède 3 rangées de taches longues et sinueuses oranges à jaunes, une à la base des élytres, une au centre et une autre plus réduite à l'apex. La tête, les pattes, les antennes et le thorax sont noirs.

Sa taille est d'environ 7 à 9 mm.

RÉPARTITION DE L'ESPÈCE EN ISÈRE

La Diapère du bolet (*Diaperis boleti*) se rencontre dans tout le département de l'Isère, mais aussi dans tous les départements de la région.

ÉCOLOGIE LOCALE

Ce coléoptère fréquente les forêts de feuillus, il est un mangeur de champignon et se nourrit d'espèces lignicoles (champignon vivant sur les arbres) comme l'amadouvier (*Fomes fomentarius*), le polypore du bouleau (*Pipopterus betulinus*), et le Polypore soufré (*Laetiporus sulphureus*).

PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS

La Diapère du bolet est particulièrement fréquente en mai, mois pendant lequel la femelle pond ses œufs.

ACTIONS FAVORABLES À L'ESPÈCE

Il faut maintenir en place les souches et les chandelles des arbres morts sur lesquelles se développent les champignons lignicoles.

LIENS

- [Club Entomologique Dauphinois "Rosalia"](http://clubrosalia.free.fr/) (<http://clubrosalia.free.fr/>) [1]