



# ACROSSUS DÉPRIMÉ



06/09/2019 - **ROSALIA** - Coléoptères

## COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?

L'Acrossus déprimé à un corps allongé aux élytres brun-rouge ou entièrement noirs. Le corps est luisant et les tibias antérieurs sont munis de dents (éperons).

Sa taille varie entre 6 et 9 mm.

Attention le groupe des Aphodius comprend de nombreuses espèces sombres pouvant être confondues avec l'Acrossus déprimé.

## RÉPARTITION DE L'ESPÈCE EN ISÈRE

L'Acrossus déprimé (*Aphodius (Acrossus) depressus*) est largement répandu et localement abondant dans les prairies et alpages des massifs montagneux du département de l'Isère.

## ÉCOLOGIE LOCALE

La larve et l'adulte de ce coléoptère se nourrissent de préférence de bouses de vache, de crottins de mouton et de cheval.



*Larve d'une espèce d'Aphodius dans un crottin, Rosalia*

## PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS

Les adultes apparaissent d'avril à septembre avec un pic d'activité en mai, juin ou juillet en fonction de l'altitude.

## ACTIONS FAVORABLES À L'ESPÈCE

Il convient de limiter l'usage des traitements puissants antiparasitaires, antibiotiques et autres aux animaux fréquentant les pâturages car ils sont rejetés dans leurs excréments et ils sont nuisibles à la faune des coprophages (destructeurs des bouses et crottins). Acrossus déprimé et les autres coléoptères bousiers ne pourraient se développer.

## LIENS

- [Club Entomologique Dauphinois "Rosalia"](http://clubrosalia.free.fr/) (<http://clubrosalia.free.fr/>) [1]